

chinese Surgery


Vol. 2











外科圖說卷二

華亭　高文晉梅溪氏輯
男　鼎玉味卿氏校

合藥諸法

九轉大降丹　此方得之異人傳授按九宮八卦合先後天之旨所制分兩出自河圖以三五七爲一家合十五之數六一八爲一家合十五之數二九四爲一家合十五之數以故分毫不可增減其中硝礬汞各一兩蓋此三物爲君其分兩共計三十錢之數合兩個十五也其中元妙有

如此者。凡遇癰疽發背。疔毒惡瘡。蛇傷犬咬。用藥厘許。以津唾調點毒上。以膏藥蓋之。毒氣收聚。頂上自然結成黑肉一塊。三四日即脫落矣

神應無比。眞仙方也。

白馬硝一白即火一兩　黑鉛二黑二錢　青鹽三碧三錢

膽礬四綠四錢　雄精五黃五錢　明礬六白一兩

大紅硇七赤七分　汞八白即水銀一兩　辰砂九紫即硃砂如豆色紫佳九分

先將上藥九味。除水銀外。都研細放於陽城礶內。然後放下水銀。上則覆一小砂盆。縫處先將桑皮紙搓軟。嵌於縫道內。又將光粉打潮濕用

以封口極要留心不可走氣外又將桑皮紙粘糊放於八卦爐中然後舉火合五九四根半香爲度結胎時炷香三根六寸合四九之數用文火謂之結胎只須三小塊中勻炭火不可旺也炭火當設一總爐以便換炭四九之香數畢爐中取出冷定其胎自成切忌開看恐傷封口出氣即走爐也後乃另取一小脚缸注了水只須齊小砂盆口下再將預脩鐵絲做就的載火器套在陽城罐底約露底寸八分然後取總火爐內旺炭攢圍礶底隨少隨添用扇長拂又炷九

寸香。降乃畢矣。取出擇一淨室中冷定次日開

看。砂盆內所有之霜。即大降也。另將磁瓶收貯

待用。愈陳愈妙。

八仙降傳杭州徐文楷先生　烏靈降傳福建楊德元先生

五虎降傳平湖馮正方先生　水火陰陽降與小降同嘉興蔣保泰先生傳

紅靈降奉賢朱卜田從楊上善先生傳來

此五方俱載外科花蜜先將簡便幾方刻出以

廣其傳但外科靈驗秘方不易輕得後醫者宜

珍重焉

八卦大降式

上用鐵罩盛炭

天柱撑

陰陽格

人和罐

地方磚

山河盆

結胎罐


護罐鼎
盛炭器

八卦大降丹

金箔十二張　銀箔二十張　銅綠二錢　銕繡八分

黑鉛一兩　活磁石一錢　元精石一錢　蛇含石八分煆紅打

金晶石一錢　銀晶石一錢　月石二錢　大劈砂三錢

水銀一兩　硝二兩　礬石一兩　大紅硇砂二錢

以上各藥研細惟鉛汞同入烊汞罐用微火和

匀取起將剉刀剉細再用微火結於礶底謂之

結胎然後用天柱撑撑之倒合在入和罐內用

白土封固曬乾外加護罐鼎再用土泥細細粘

縫勿令洩氣放在山河盆內磚上炭火先文後


武降三枝半香

小降式 方用藥瓬 白礬 月石 掃盆 廣硇 法如大降

羊城罐

方甎

升藥式



用五枝香以天地人去一寸或用陰陽法陰上二陰下足陽全每兩約炭一觔轉法以小碗將竹

貢紙用飯作線飯粘燒一寸　五色粉霜卷五尾

三仙丹　外科拔毒去腐第一仙方

水銀一兩　火硝一兩　明礬一兩

硝礬研至極細先入鍋內次入水銀在前昇法

四寶丹　五寶丹　六寶丹　七仙丹　八寶丹

九靈丹

以上六方俱詳外科花蜜

以下內服諸方

參薑飲　黨參　甘草　生薑

全生煎　生耆　炙草　當歸　陳皮　營實

山甲

活絡開凝湯 歸尾酒炒三錢 赤芍錢半 川芎酒炒八分 生甘草三分

綿芪二錢 天花粉二錢 甲粉二分 加薔薇花刺二分

黃芪鷄首煎 人參三分 綿芪三錢 草節一錢 川芎八分

歸身錢半 化橘紅錢半 赤芍錢半 加雄鷄頭一枚酒洗去毛

返本湯 黨參 冬术 當歸 黃耆 炙甘草

肉桂 乾薑 陳皮

保元湯 黃耆 肉桂 於术 炙草 大棗

人參 生薑

補益湯 人參 黃耆 熟地 生地 川芎

當歸　婁殼　柴胡

峻補煎　五味子　麥冬　人參　甘草　當歸

黃耆

培中湯　嫩黃耆　薯蕷　木香　白芍　人參

冬术　茯苓　甘草　陳皮　半夏

奇功飲　人參　於术　雲苓　炙甘草　陳皮

半夏　炮薑　附子　坎炁

附子理中湯仲景　人參　冬术　乾薑　炙甘草

附子

六君子湯　即奇功飲去炮薑附子坎炁

育珠退熱湯　人參　生地　麥冬　化州橘紅
青蒿　生穀芽
聖愈湯　人參　黃耆　熟地　生地　當歸
川芎
歸脾湯　黨參　冬朮　炙甘草　茯苓　木香
黃耆　棗仁　遠志　當歸　桂圓肉
養營湯　人參　冬朮　茯苓　炙草　當歸身
熟地　白芍　肉桂　黃耆　遠志　五味
橘皮　大棗　生薑
補中益氣湯　人參　白朮　當歸　柴胡　黃耆

炙甘草　升麻　橘皮

七味白朮散　人參　茯苓　白朮　煨木香

葛根　炙甘草　藿香

疎肝散毒湯　人參　茯苓　冬朮　炙草　佛手

青皮　嫩柴胡

十全大補湯　人參　雲苓　於朮　炙草　熟地

川芎　當歸　白朮　肉桂　黃耆與一卷内方不同

生脉散　人參　麥冬　五味子

五柴胡飲　人參　柴胡　陳皮　甘草　當歸

七福飲　熟地　人參　當歸　炙甘草　遠志

白术　大棗

貞元飲　熟地　當歸　甘草

開結散　沉香　枳梲　白术　陳皮

壽脾煎　人參　白术　遠志　當歸　淮山葯

蓮肉　炙草　大棗

逍遙飲　當歸　白芍　生地　炙草　酸棗仁

陳皮　遠志

三陰煎　即逍遙飲去陳皮遠志加人參

養心湯　人參　神麴　白雲苓　赤苓　半夏

黃耆　肉桂　遠志　五味　川芎　甘草

　當歸　棗仁　栢子仁　熟地

異功散　人參　冬朮　茯苓　甘草　陳皮

建中湯　十全大補湯加附子半夏肉蓯蓉麥冬

都氣丸　熟地　茯苓　山葯　五味子　澤瀉

　丹皮　山萸肉　去五味子即六味丸加味地黃丸見卷五尾

一陰煎　大熟地　生地　炙草　丹皮　牛膝

　人參

加減一陰煎　前方去丹皮牛膝加地骨皮知母

大營煎　人參　熟地　炙草　歸身　淮山葯

　枸杞子　杜仲

左歸飲景岳 熟地 山藥 雲苓 炙草 枸杞
山萸肉
左歸丸 熟地 枸杞 山藥 山萸肉 龜版
牛膝 菟絲子 鹿角膠
右歸飲 熟地 枸杞 山藥 肉桂 山萸肉
附子 杜仲 炙甘草
右歸丸 熟地 枸杞 山藥 肉桂 山茱萸
附子 杜仲 當歸 菟絲 鹿角膠
金匱腎氣丸 即都氣丸去五味子加肉桂附子
葦莖湯 桃仁 薏苡仁 瓜瓣即瓜子肉 葦莖即蘆根

牡丹皮湯 桃仁 大黃 瓜瓣 朴硝

參園飲子 人參 於术 茯苓 炙草 陳皮

黃耆 銀花 紫參 紫菀 烏梅 合歡皮

猪腎薺苨飲千金 薺苨 茯神 知母 活磁石

葛根 甘草 石膏 人參 花粉

黑豆 黃芩 猪腰子

通邪煎即通邪表毒湯 荊芥穗 防風皮 土茯苓皮

杏仁 天名精即土牛膝 廣橘紅 赤茯苓皮

枳椇 其銀花連翹黃連桑葉薏苡萆薢澤瀉

隨證出入加減

……湯泄毒煎 銀花 澤瀉 土牛膝 ……

防風 連翹 五茄皮 通草 甘草梢

皂莢核

掃癀飲 蟬衣 赤芍 銀花 胡連 土茯苓

凝膚湯 蒼耳子 苦參 獨活 連翹 鬱金

杏仁 通草 車前 火甚加黃連生軍

甘露飲子 天冬 麥冬 生地 熟地 石斛

黃芩 甘草 澤瀉 茵陳 枇杷葉

利膈湯 黑元參 桔梗 蟬衣 薄荷 連翹

苦杏仁

六和湯　人參　於术　藊豆　木瓜　炙甘草
半夏　杏仁　砂仁　厚朴　茯苓　藿香
大棗　生薑
防風通聖散　麻黃　杏仁　甘草　大黃　芒硝
薄荷　白术　茯苓　荊芥　川芎　桔梗
滑石　梔子　連翹
大防風湯　肉桂　附子　黃耆　當歸　冬术
雲苓　炙草　熟地　黨參　牛膝　羌活
防風　杜仲　橘皮與四卷鶴膝風方不同
復元活血湯　紅花　花粉　桃仁　延胡　歸尾

大黃　橘皮　山甲

發鬢毒

此毒受在手陽明經氣虛風熱上壅風毒成瘡當用清心流氣飲次用內托流氣飲治之此症客于會合之前灌在鬢後形如米粒漸次赤腫遍身灦

熱

淸心流氣飲

茯苓　防風　甘草　柴胡　羌活

川芎　獨活　紫蘇　連翹　赤芍

人參　白芷　前胡　山梔

內托流氣飲

人參　黃芪　厚朴　甘草　紫蘇

桔梗　枳殼　烏藥　細辛　當歸

防風　川芎　白芷　鼠粘子　芍藥

姜三片煎服　蠟礬丸日進三四服



鬢疽

此疽受在脾胃心肺熱氣結成毒也當用敗毒流氣飲清肝流氣飲治之或醫緩之命亦難生矣慎之慎之

敗毒流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼　甘草　白芷
川芎　薄荷　生地　乾葛　麥冬
當歸　芍藥　柴胡　天花粉　鼠粘子
右水煎食後服

清肝流氣飲

桔梗　枳殼　甘草　防風　前胡
羗活　青皮　生地　黃芩　獨活
川芎　當歸　芍藥　茯苓　小柴胡
姜三棗一煎服　蠟礬丸時時服之

痄腮毒



此毒受在牙根耳䏆通手肝腎氣血不流壅滯頰腮此是風毒症先用清肝流氣飲後用托裏流氣

飲治之

清肝流氣飲

枳殼　桔梗　黃芪　前胡　羌活

甘草　石膏　防風　川芎　芍藥

荆芥　白芷　生地　薄荷

托裏流氣飲

人參　黃芪　當歸　川芎　白芍　甘草

防風　厚朴　烏藥　官桂　木香

姜三棗一煎服

患處用圍藥敷之

耳風毒

耳風毒受在心腎氣不流行壅在心經致傷于耳

五種耳痔耳蕈耳壅耳濕耳爛可用清肝流氣飲

後用定痛降氣湯治之如遇耳痔耳蕈先用針刺破用紅玉膏點之耳脹痛用虎耳草汁滴入耳內痛即止耳疔以燒酒滴疔根上方得脫瘥用苦茶洗解酒毒

清肝流氣飲

枳殼　桔梗　黄芩　前胡　羌活
青皮　小柴胡　薄荷　生地　烏藥
甘草　防風　川芎　白芷　石膏
赤芍　右用水煎服

定痛降氣湯

紫蘇　厚朴　陳皮　甘草　半夏

前胡　川芎　防風　芍藥　白芷

當歸　黃柏　知母　乳香　小柴胡

姜三片棗一枚煎服不拘時

若耳輪赤爛清凉膏貼之

耳脹痛

用江魚齒又名腦内骨火煆爲末水調滴入耳内

耳門癰

耳根癰

耳門癰受在肝經毒氣傳注血不周流此是惡毒

症也當用前煎藥治之

耳根癰受在腎經絡怒氣傷心凝滯肝經風熱壅

盛成毒也當用眉風藥治之

頦上者不為風　頦下者要成漏瘡此症不可輕

易用眉風藥治之可也

用前淸肝流氣飲活法施治之

發耳



其瘡生於耳邊又名熱毒發疽五六月間漸長如蜂窠皮紫者亦熱諸處如火燒痛不可忍十日可刺無膿者十一日死若瘡不硬刺見白膿者不死潰膿出者不死無時出鮮血者及赤膿者死食不知味多謊語者亦死在二十日之間便見凶吉

煎藥用千金內托散隨時增損之

項疽毒



此毒因五臟受毒氣壅血枯伏在風府之間惡疽

如當用敗毒流氣飲治之後用內托流氣飲

敗毒流氣飲　紫蘇　桔梗　甘草

川芎　小柴胡　青皮　枳殼　防風

羌活　白芷　芍藥　當歸　連翹

獨活　右水姜三棗二煎服

內托流氣飲　人參　黃芪　厚朴

甘草　紫蘇　桔梗　枳殼　官桂

[illegible]　烏藥　當歸　防風　白芷

[illegible]术　川芎　柴胡　煎同前

[illegible]人　赤香附　夏天去官桂加麥冬


風毒攣癱

一人肥壯素能飲酒酷暑遠行酒醉居于舟中臥

于風內又爲日色暑氣相侵并有七情所干歸家

不免于色慾頸項間忽痛如失枕之狀其名曰何

乃風熱鎖喉毒也久則紅色遶于肩背堅硬難消

急服清暑疎風散

清暑疎風散

羗活　防風　荊芥　升麻　甘草

乾葛　蒼朮　厚朴　川芎　當歸

白芍　獨活　白芷　桔梗　紫蘇

大柴胡　薄荷　薄桂　枳殼　蔓荊子

木香　藁本

水二鍾姜七片葱白三根濃煎熱服隨飲好酒以助藥力以衣覆患上出汗爲要交用圍藥并服千金托裏散加疎風清暑之劑



風毒發疽

此瘡受在氣血不通凝滯脾胃有傷經絡或過食
炙煿或被毒氣聚結成瘡或乘虚為賊風所吹當
用溫中順氣飲　順氣飲孕婦加減服

溫中順氣飲

生地　茯苓　厚朴　白术　甘草

青皮　枳殼　桔梗　當歸　川芎

防風　木香　白芍　蓬术

右用姜三片棗二枚煎服不拘時

若孕婦去蓬术厚朴加砂仁陳皮


頂門癰

此癰受在六府與陰陽不調氣上熱壅而成瘻毒傷於腦經於是毒症不可輕忽先用敗毒流氣飲後服內托流氣飲治之

外用救苦拔毒膏

雄蜒蚰一二條和葱白二寸搗極爛加雄黃末一錢白芨末一錢和勻敷患處留孔乾用水潤之何爲雄蜒蚰背上有白紋者是也對口瘡發鬢發疽之症亦治

用敗毒流氣飲

人參　乾葛　枳殼　桔梗　甘草

柴胡　防風　細辛　薄荷　川芎

羌活　芍藥　獨活　白芷　紫蘇

天花粉

姜三片棗一枚水煎食後服

不消用內托流氣飲

人參　木香　黃芪　厚朴　甘草

紫蘇　桔梗　官桂冬加夏減　檳榔　烏藥

枳殼　當歸　川芎　芍藥　白芷

姜三片棗二枚煎服

或熱加柴胡黃芩　去官桂

或痛加玄胡索　五靈脂乳香
或瀉痢加附子　人參　白术炒上澤瀉
胃氣不順加陳皮茯苓　半夏　山藥
嘔吐加生姜藿香



肩風毒

此毒受在肝經氣血上壅結聚成毒當用敗毒流氣飲內托流氣飲清肝飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇 桔梗 生地 薄荷 青皮 枳殼
甘草 防風 川芎 羌活 前胡 連翹
芍藥 小柴胡

內托清肝飲

人參 黃芪 厚朴 甘草 防風 桔梗
花粉 枳殼 藁本 升麻 烏藥 當歸
白芍 白芷 川芎 金銀花
姜三片棗二枚煎服

圍藥 用頂門癰救苦拔毒膏治之如無蜒蚰急用
金箍散敷之立効

發眉瘡

發眉瘡從眉至頭生瘡色黑其腰漸漸腫氣浮滿

面其瘡如石針刺無膿其水自出痛不可忍悶亂嘔逆者正是此瘡六日可刺出膿如吐逆心悶漸減可治如不能減男子二十四日而須女子七日而終矣急用止疼之藥治之

止痛拔毒散

升麻　甘草節　鼠粘子　乳香　山梔

黄連　歸須　川芎　白芍　生地

桃仁　黄芩　羌活　獨活　桔梗

白芷　青皮　蟬殼　連翹　金銀花

宜搽紫金錠　服護心散

上下眼丹

此毒受在心肝氣毒上攻壅而聚此丹毒當用淸心流氣飲治之兼服黃連敗毒丸

淸心流氣飲

茯苓　防風　甘草

紫蘇　羌活　獨活　川芎　青皮

薄荷　黃芩　柴胡　荊芥　赤芍

麥冬　連翹　蔓荊子　石膏　右水煎服

黃連敗毒丸

黃連二兩　甘草一兩　連翹一兩　防風一兩五錢　羌活一兩

細辛一兩　薄荷五錢　黃芩一兩酒炒　甘菊花一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每五十丸食後白湯下

搽藥　皂礬五錢　大粉草二兩　二味同煎濃膏加冰片少許用鴨毛潤眼眶上即愈

發頤毒一名流注

此毒傷寒後餘毒不散汗發不透故發此癰在頭

耳一寸三分在心窩兩肋在身者可治在耳後相
連咽喉恐毒氣內攻難進飲食藥餌鼻流清膿兩
耳閉塞者卽死無卽生用前二十四味流氣飲熱
服以出其汗次服千金內托散　患上用鐵箍散
將姜汁好醋加蜜少許和勻火上熬熱調藥搽四
向空中出毒時用餘汁溫潤之
千金內托散
桔梗　厚朴　白芷　防風　人參
黃芪　川芎　甘草　當歸　官桂
黃芩　白术　煎服

不換金散

半夏　厚朴　蒼朮　陳皮

人參　藿香　茯苓　木香

後再服乳香護心散　仍貼金絲膏


穿腮

一名骨槽風一名穿珠一名附骨一名穿喉一名

牙槽風

此毒因憂思驚慮太陽受症結于大腸之間邪毒交生灌于經絡之內初起生于耳下及項間隱隱皮膚之內略有小核漸長如李子之狀便覺紅腫或上或下或左或右牙關口噤不開急用鵞毛攪出風痰即服驅風破毒散立愈

驅風破毒散

白礬　巴豆去殼油　紅內硝　草烏尖

猪牙皂角　薄荷各等分　右爲細末吹之

又方

天麻　防風　草烏　華撥　細辛

乳香　川芎　朋砂　薄荷　麝香

溫水嗽口或鼻內吹之

此症小兒亦生者其故何也稟氣虛弱感風寒暑熱相結成疳或恣食肥甘生冷甜物餘穢積成于牙縫不能滌洗去垢漸爛至臭膿血淋漓日久則氣血凝滯結成多骨而出甚至爛漫穿腮急用珍珠冰片散搽之

珍珠冰片散

珍珠一錢　紅絨末一錢　人中白煅一錢　枯礬二錢
鷄內金煅存性一錢　氷片五分　麝香二分　銅青一錢
青錠一錢　黃連末一錢　孩兒茶一錢　細芽茶一錢
右爲細末先用蚌水繳淨患處每摻入之一日夜一二十次之方愈男婦亦然并服煎劑

淸熱消痔散

乾葛　升麻　生草　黃連
黃芩　茯苓　桔梗　薄荷　防風
荆芥　羗活　青皮　牡丹皮　當歸
白芍　生地　鼠粘子

水三鍾燈心三十莖煎服

虛加人參白术年久加草龍膽　熱加柴胡前胡


頦癬

此毒生于頦上不爲風頦下要成漏瘡不可輕易

當用敗毒流氣飲　再用內托淸肝飲

二方見前　圖藥同前


面風毒

此毒氣血壅上結聚成毒當用鬚疽藥治之先用
敗毒流氣飲　後用淸肝流氣飲治之
外用圍藥敷之


發鬚毒
發髭毒

此發鬚者脾胃虛熱心肺邪風上攻禾髎之端多
在承漿之側形如羊刺四邊腫硬痛楚難禁時流
黃水麻痺增寒壯熱毒氣下流心胸主壯逆皆伏
陽攻于心肺虛熱注于三焦內服當歸內托散外
微擦破以神應散搽之

神應散

輕粉一錢　雞內黃二錢　麝香三分　氷片三分
黃柏末二錢　韶粉二錢　五倍末一錢　黃連二錢
右為末先用甘草苦參猪蹄薄荷白芷防風荆芥
煎湯洗淨拭乾將陳菜油猪膽汁調搽之



賴毅壽

此毒因腎經有熱水枯不能上潤于心火故發此毒急服人參敗毒散加五味子　千金內托散蠟礬丸每服五六十丸連進十餘服待痛軟頭用替針丸咬破不可用針刺若針刺瘡口出黃水四圍生細黃泡遍面遊走再用敗毒散圍四畔治法同發髭毒煎劑隨時施治



石疽

石疽雖與石癰同惟石疽深寒客于經絡血氣結聚不散隱于皮內癧按之如石此毒連頸項之間

內先潰爛方出皮膚悉髓出頭項者即死用排膿內補十宣散待膿盡內補散戀心乳香護心散仍貼金絲膏渴甚加五味天花粉乾葛麥冬烏梅初起須用艾火灸患上三四十壯發于額面者不可灸

煉石散 堅如石碗其色不變

鹿角燒灰八兩 白蘞三兩 粗麤黃石二斤 右用好醋五升先燒石通紅淬醋中再燒再淬醋盡方止爲末加二味末將剩下醋調如泥塗上消軟灸處亦塗之

又方 以商陸搗碎塗患上


癩道人

此毒生于頰車之上多者皆出于附骨亦名附骨
疽若不速治漸刋其骨久後必致成漏終不能痊
治方于後內托散加羗活　獨活　水煎服
次用十奇散加川椒　細辛　桔梗　青皮
外用閽藥搽之



滿肩者

夫漏睛瘡者肝臟毒氣小腸邪風外攻腎端灌于
瞳人初生疼痒漸成膿水其色如痂日久睛昏氣
敗肝絕難救之症慎之慎之
先服黃芪當歸川芎生地白芍黃芩薄荷荊芥連
翹白芷升麻桔梗天花粉之類
次用黃連地骨皮當歸煎湯溫洗
治方關要惟補腎宣肝為急學者宜參詳之不可
輕視之也



鴉啗者久中邪熱臟腑虛寒血氣衰少勝理不密發于皮膚之上相生如錢竅後爛似鴉啗日久將來損傷難治小兒同前其治法用陰蝕瘡之藥治之

鴉啗散

老鴉毛燒灰　大紅絨灰一錢　珍珠五分　氷片一分
枯礬五分　輕粉三分　黄丹一錢　麝香少許

右爲細末先用苦茶洗淨乾摻其煎劑以意加減用之



繭唇
此症生在唇上

繭唇者此症生于嘴唇也其形似蠶繭故名之內經云脾氣開于口又云脾之榮在唇但燥則乾熱則裂風則瞤塞則揭若腫起白皮皺裂如蠶繭故定名曰繭唇也始起一小瘤如豆大或再生之漸漸腫大合而爲一約有寸厚或翻花如楊梅如疙瘩如靈芝如菌形狀不一皆由六氣七情相感而成或心思太過憂慮過深則心火焦熾傳授脾經或食醲酒厚味積熱傷脾而腎水枯竭以致之須審其病症之因惟補腎水生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消矣此亦異症所生者少人亦難

膮若久不愈者急用金銀烙鐵在艾火内燒紅燙

之内服歸脾養榮湯庶易愈矣若外用追蝕惡毒

線結之法反爲所傷慎哉慎哉若婦人患此陰血

衰少故也宜用四物逍遥散治之

歸脾養榮湯

當歸　川芎　白芍　生地　茯苓

陳皮　小柴胡　甘草　麥冬　升麻

山梔　桔梗　黄芪　白术　防風

黄連　牡丹皮　黄柏　知母

婦人加澤蘭香附玄胡索

烙鐵法

不拘金銀打成烙鐵每用艾火燃燒通紅乘熱盪患上再燃再盪一日止可五六次恐傷元氣須要擇上吉日不犯尻神盪畢隨將藥搽之庶不再生矣

除根搽藥

莧菜陰乾燒灰三錢　銅青二錢　枯凡二錢　輕粉一錢

雄黃一錢　鷄內金二錢　麝香二分　孩兒茶二錢

右爲細末麻油調搽明日再用甘草湯洗淨再烙



如前以平為度 後用生肌散 花蕊石 醋煅二錢 孩兒茶 二錢

鷄內金 二錢 飛丹 煅水飛一錢 乳香 一錢 血竭 二錢 紅絨灰 一錢

黃連 一錢 為末加冰片一分乾摻

此發腦者伏陽結滯邪毒上壅或生玉枕之端或在風池之穴或多或少大小不同形如硬癤漸至潰爛遍生髮中痛如刀刺赤腫無膿逆則黃水出順有白膿來治法以當歸川芎人參赤芍連翹桔梗天花粉升麻酒炒黃芩山梔金銀花黃芪乾葛之類以意消息治之外用紫金錠水磨搽之或大者以膏藥貼之一日三次宜服蠟礬丸

蜒蚰不拘多少和葱搗爛絞汁加氷片麝香少許搽之


頭後蜂窠散注
流
流

此疵發於頭後如是蜂蕫者急宜救之若焮赤腫


痛起者得療瘀發者必難治矣急用調治之若或

流於兩肩者决不可療也治法與發胸者同



此毒蓋因風熱上攻入於內發此疽疾量人年紀老少用藥人年五十以上難治少壯可治更服內疎黃連湯十數貼加 羗活 金銀花 荆芥

千金托裏散 宜服黃礬丸 外貼金絲膏治法與對口瘡同




此毒受在腎藏虛實熱壅上腦戶結伏成毒也初起三日者剃去髮以艾炷如豆大者灸五壯外用圍藥庶能消矣當用三香內托散定痛消毒飲治

之
人參　當歸　升麻　川芎　白芍　桔梗
枳殼　茯苓　半夏　柴胡　甘草　羌活
防風　厚朴　白芷　天花粉
右剉姜三片燈心三十莖空心服
三香內托散
人參　木香　黄芪　厚朴　甘草　紫蘇
枳殼　官桂　烏藥　白芍　白芷　川芎
防風　乳香　姜三棗二水煎不拘時服
上中下三搭手俱用此

對口瘡

此毒因虛陽上攻熱入於脳故生此疽正透咽喉

此症生頸後兩邊左右布鬢髮邊發生急宜救之如核硬而發者急宜取去病根如腦心發者熱氣上攻於腦四畔邊焮赤腫硬連於耳項寒熱疼痛若不急療毒入血肉腐壞爲膿水頭中出血者氣喘及痰發者難治治法同前宜加減用引經藥



一回發毒

此症之發多起於房勞太過乘虛風入經絡陽明經虛發於面也或面生癬癌患者欲求速愈面庸醫或以毒藥敷點或以艾火灸之或以針刀刺之或犯尻神惡宿或破後房事不戒或受狂風霜雪寒露暴戾之氣或服金石草木諸部惡毒相攻相反之劑以致病症日劇殊不知面為諸陽之首禁火禁刀禁毒況耳目口鼻之官總係一處比四肢不同若不保重命亦難生何也面為陽火氣入之薰蒸肌肉刀針刺之卽傷經絡毒藥點之暴剝皮肉轉轉為患繼之以風邪入之則頭面虛腫目鼻

腫脹患處口腐其臭穢難聞脾胃日削寒熱交作痛楚萬狀難以盡言若有五善而無七惡外敷清凉拔毒之藥內服参术內托之劑每合犀角鬱金散服之以拔積毒其命方可保也否則難生

清凉拔毒散

白芨　雄黃　麝香　乳香　山茨菰

天花粉　黃栢　烏藥

右爲末鷄子清調付蜜水潤之

參术內托散

人參　白术　粉草　犀角　貝母

黃連　防風　黃芩酒炒　羌活　桔梗

當歸　生地　白芍　前胡　天花粉

因病之逆從而加減之　水二鍾姜三片煎服

犀角鬱金散

犀角　鬱金　眞珠　牛黃　粉草

乳香　眞粉　辰砂

煉蜜爲丸噙化


瘡

一人面上及遍身生瘡似猫眼有光彩無膿血多
則近脛名曰寒瘡此乃脾家濕熱所化宜服雄黃
解毒丸再服清肌滲濕湯多食魚鷄葱韭而愈惟
鯉鮎魚蝦蟹不可食

清肌滲濕湯

蒼术　白术　升麻　甘草
澤瀉　山梔　黃連　厚朴
茯苓　當歸　川芎　青皮
木通　苦參　車前子　小柴胡

此症手少陽三焦經主之大抵二經多氣少血圖

驚憂思慮故生此疾初起生於耳下及項間并腦含下至缺盆在鎖子骨陷隱隱皮膚之內初生如豆漸長如李核之狀或一粒或三五粒按之則動而微痛不發熱惟午后微熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠則堅而不潰潰而不合皆因氣血不足往往變爲癆瘵自覺紅腫或上或下或左或右連串三五箇破潰遍項漸流膿血致成瘰癧獨形者爲結核續欲連結者爲瘰癧但此症原不係膏粱之變因虛勞氣鬱所致宜以益氣養榮之藥治之其瘡自消若金石暴悍之劑血氣愈損不能生

矣若不速治必至喪生

益氣養榮湯　治抑鬱及勞傷氣血頸項或四肢腫硬或軟而不赤不痛日晡微熱或潰而不斂並治之大劾

人參一錢　白术炒一錢　茯苓一　陳皮　貝母　當歸

川芎　黄芪　熟地　白芍　桔梗　甘草

香附米各一錢

右作一劑水二鍾煎八分食遠服

胸痞滿人參地黄各減三分　口乾加五味子麥冬　往來寒熱加小柴胡地骨皮　膿清倍加人

參黃芪　膿多加川芎當歸　膿不止加人參黃芪當歸貝母　肌肉遲生加白斂官桂

馬刀瘡與瘰癧同條少陽膽經主之此二經亦多氣少血或在耳之前后或在耳下連及頤含或在胸及胸側或在兩脇久堅不潰皆謂之馬刀瘡也故多堅少軟膿白如稀糊似泔水狀治者求本清可也形表如蛤者爲馬刀瘡

夏枯草湯　瘰癧馬刀瘡不問已潰未潰或久成漏並宜服之

夏枯草六兩　水三碗煎至一碗去查食遠服此生

血補虛消毒之聖藥濃煎膏并塗患處多服十全
大補湯加貝母香附遠志
治瘰癧已成未成已潰未潰以手置肩上微舉起則
肘骨尖自現是灸處如患左灸左肘患右灸右肘
若左右俱患兩肘皆灸以三十四十壯爲期更服
補劑一年灸一次三灸其瘡自除如患三四年不
愈者辰時灸起至酉時方止三灸即愈更服益氣
養榮湯
又方灸法未成膿者用大蒜切片如三錢厚者安患
上用艾炷於蒜上灸之至三五壯換蒜每日灸十

數蒜片以拔鬱毒如破久不合肉有核或瘀肉此因氣血不足不能腐爛更用江西豆豉爲末唾津和爲餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼金絲膏瘡口自合矣

瘰瘡痰核噙藥

昆布酒洗　海藻酒洗　大黃酒拌蒸三次　殭蠶姜汁拌炒

青黛各二錢　桔梗一錢　連翹二錢　膽星二錢

柴胡　片芩酒炒　橘紅　黃連酒炒

瓜蔞各一錢

右爲末煉蜜丸如芡實大不拘日夜噙之


神効灸治瘰癧穴法
肩井穴
肩井穴
鼠尾穴
鼠尾穴
二鼠尾穴在手臂上大肉處是穴

治男子婦人小兒患此症者依此四穴燒灸無不効肩骨尾盡處是肩井二穴左肩灸左右肩灸右左右俱有俱灸鼠尾一穴用草一莖男比左手女比右手中節横紋攢量過四肢紋盡處比交折斷將至絲螺骨尖中比至脚后總筋中是穴鼠尾左灸左右灸右俱有俱灸一年五壯年深多灸專治一切發者須要禁忌房事神効不虚可以活人灸畢瘡爛車前草葉搗爛貼之看遍身神人所在禁忌并擇天醫黄道吉日

灸忌　凡灸忌諸魚熱麵生酒生冷物鮮肉及房勞

又灸兩手掌后四寸兩筋間各七壯以病人中指横

紋量至本指尖爲四寸再灸肘尖左病灸右右病

灸左各三壯不過三次除根

如神散　瘰癧已破瘡口不合

松香末一兩　白礬三錢　爲細末油調搽乾掺亦可

散腫潰堅丸　瘰癧馬刀服益氣養榮湯不能消散

者宜服此丸五日再服益氣湯五日相兼服之

知母　黄柏　廣茂　天花粉俱酒拌炒

昆布酒炒　連翹　黄連炒　葛根　白芍

京三稜各三錢炒　升麻　當歸梢　甘草

小柴胡各一兩　草龍膽四兩炒　黃芩一錢五分一半生用一半酒炒

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸白沸湯送下

神秘散　服散堅丸益氣湯不愈宜進此藥再服益氣湯

斑猫十枚去頭足翅同糯米炒去米不用為末　荆芥穗二錢

黑牽牛末一錢　[illegible]鼈末二錢炙

和勻每服二錢五更溫酒調下日午惡物從小便中出如小便澁或痛以葱白湯飲之或木通湯下

以米粥補之若不下明早五更再服以下爲度
力者不可下每早服之五早爲度

得効針頭散　追蝕惡瘡瘀肉

赤石脂半兩　乳香　白丁香各二錢　砒生用
黃丹各一錢　輕粉七分　麝香三分　蜈蚣一條炙

右爲末掺於瘀肉上或瘡口小就搽瘡口上瘀肉自去更以膏藥貼之肉亦去嘗用砒末二錢以白礬末二錢和勻同火上飛過用礬一錢合藥亦効但不及生砒之功速耳

柴胡連翹湯　治馬刀瘡

小柴胡五錢　鼠粘子二錢　薄桂五錢　連翹五錢
瞿麥穗六錢　炙草三錢　生地三錢　歸尾一錢五分
黃柏三錢酒拌炒　知母三錢　黃芩酒拌炒
右㕣作四劑水煎服之

消毒湯　治馬刀瘡

柴胡二錢　連翹二錢　歸尾一錢　紅花一錢
甘草一錢　生芩二錢　黃連五分　天花粉二錢
鼠粘子五分炒　黃芪二錢

柴胡通經湯　小兒項側有瘡堅而不潰亦名馬刀
瘡

柴胡　連翹　當歸尾　黄連
黄芩　生甘草　鼠粘子　桔梗
三稜　紅花　川芎　水煎服
必効散　治瘰癧
硼砂二錢五分　輕粉一錢　麝香五分　檳榔一枚
斑猫四十去頭足翅　巴豆五枚去皮心膜
右同研末取鷄子淸二枚去黄調藥勻傾在鷄子
殼內濕綿紙數層糊定勿令透氣飯上蒸熟取藥
晒乾研末用時看病人虛實虛者用五分實者用
一錢並用煨熟老姜煎酒五更空心調下天明取

下惡物如小腹內疼痛便用天麻子燒灰一錢沒
藥一錢同研爲細末茶壽調下一錢取下惡物或
如爛肉或如初出老鼠或新成卵內雀兒是藥効
驗婦人有孕不可服

治頸上瘰核飲之半月即効

青木香根葉　獨脚將軍草各一斤
右用大酒十斤放二味在瓶內封固瓶口重湯煮
三枝官香爲度埋地中三日出火毒飲之

立消紅腫瘰核　用石灰窑內紅土壁爲末菜油調
搽窑中出毒出膿以膏藥貼之

燕瘡

大抵下部之症以蒼术爲主佐以黄柏之辛行以青皮加以甘草隨症用引經之劑則得効矣此毒受在肝腎經痛不可忍用内托流氣飲治之

蒼术　黄柏　青皮　甘草　芍藥

當歸　白术　檳榔　川芎　羌活
獨活　白芷　木瓜　牛膝　杜仲
冬加薄桂　夏加黄芩　姜三片煎服
內托清氣飲　人參　茯苓　白术
官桂　陳皮　木瓜　紫蘇　枳殼
甘草　芍藥　當歸　蒼术　羌活
獨活　川芎　白芷　姜三片棗一枚煎服
再服紫蘇流氣飲　三香和氣飲
搽藥用腿遊風及婦人濂瘡藥通用


委中毒

此毒受在腎經寒氣阻滯而成加減紫蘇流氣飲

治之先用敗毒流氣飲

先服敗毒流氣飲　紫蘇　厚朴　枳殼

桔梗　陳皮　烏藥　白芍　白芷

香附　檳榔　木香　木瓜　牛膝

杜仲　防風　甘草　姜三棗一煎服

後服紫蘇流氣飲　紫蘇　厚朴　甘草

香附　烏藥　檳榔　杜仲　木瓜

枳殼　桔梗　川芎　防風　當歸

姜三棗一空心服　排膿加人參黄芪

臂疽

此癰受在腎經而臂屬少陽後此陰中之陰道遠

位僻藥力所難及者須預補之皆因受虛寒濕毒結聚成風故生此症也當用上下肋癰藥治之

敗毒流氣飲　內托流氣飲　內托羌活湯

羌活　官桂酒洗　大黃酒洗各四分　黃芪一錢五分

藁本　連翹　歸稍各一錢　炙草

陳皮　蒼朮各五分　白芷

右作一服水酒各一鍾煎空心熱服以被覆患上使藥力行之方能奏功如或不愈用鐵箍散姜汁醋火上熬熱調敷留孔時令熱餘汁潤之以助藥力

腿遊風



此癰受小腸腎經傷于寒熱邪氣毒流于腿此是遊毒也當用紫蘇流氣飲治之後服敗毒流氣飲

紫蘇流氣飲

紫蘇　檳榔　厚朴
甘草　香附　烏藥　獨活　白芷
荆芥　蒼术　黄柏　陳皮　木瓜
枳殼　川芎　防風　姜三棗一煎服

敗毒流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼
檳榔　陳皮　羌活　防風　荆芥
木瓜　桂枝　黄柏　獨活　烏藥
甘草　香附　山梔仁　熱服

先用金絲膏貼四五日以拔其毒水後用搽藥治之

搽藥

輕粉二錢　黃連末三錢　孩兒茶一錢

黃柏末一錢　白芷末一錢　荊芥末一錢　雞內黃一錢

氷片二分　枯凡二錢　韶粉三錢

右和匀爲細末先用溫茗茶洗淨再用紙挹乾滋水乾搽

陰囊毒　即外腎癰

此症因肝經濕熱不利遂流毒于膀胱腎經感冒

寒暑邪氣偏腎于陰之經絡以至血氣凝聚寒濕不散陰囊上腫而痛或潰爛皮脫腎子懸掛宜用

瀉肝清熱湯服之

龍膽草 酒拌炒　當歸稍　車前子 炒　澤瀉

生地　芍藥　黃連　黃柏　知母

木通　淡竹葉　防風 各二錢　甘草稍 五分

右作一劑水二碗煎八分食前服

外用鐵箍散圍之

此症腐壞急用烏金散敷之

烏金散　麩 不拘多少煅存性爲末　紫蘇葉

俱爲末香油調搽乾摻亦可

或潰爛飲食少思日晡發熱急服加味小柴胡湯

小柴胡 人參 黃芩 川芎 白朮

黃芪 當歸 甘草 黃柏 知母各一錢

半夏五分 白芍五分 右水煎服

痛甚加黃連 小便不利加木通車前子

口渴加天花粉麥冬五味

腎癰



此毒年高者因宿有疝氣疾及感冒寒濕氣辛勤少壯爲因房事所得初起陰囊赤腫身發寒熱攻小注歸來二穴痛不可忍用手按之皮寛不急可用敗毒散加入當歸須　川楝子發散　用手按之急脹似火之熱急用陰囊毒之藥治之更服黃凡丸倘或開刀須待其熟以油頭繩扎住腎子以小刀開海底穴其膿血卽流盡矣外貼金絲等膏少勞戒色并避湯火風氣及諸毒物

陰蝕瘡



此陰蝕瘡之生也皆由臟中虛怯腎氣衰少風邪

入腑毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不曾洗淨故時痛時痒以漸成瘀作疳膿水湧流若不早治命亦難保先用蛇床子地骨皮桑槐枝煎湯溫洗內服清熱消疳解毒湯外用摻藥先用金絲膏後用紫金膏拔出毒水易能長肉

摻藥

輕粉二錢 孩兒茶二錢 紅絨灰一錢五分

飛丹一錢 氷片三分 珍珠五分 雞內金煅存性一錢

射香二分 蘆甘石煅一錢

夫陰蝕瘡者即下疳也陰汗燥臭故莖根生疳瘡

此處乃肝經所屬之分野

清濕瀉肝湯

升麻　羌活　柴胡　知母　黃柏

生甘草　澤瀉　青皮　川芎　生地

蒼朮　龍膽草　木通　水煎　熱加黃芩

小便不利加車前子　虛加人參

又方　氣弱無力莖根下生瘡膿水不止

人參　黃芪　當歸　柴胡　升麻

草稍　黃柏　知母　膽草　紅花

白芍　黃芩　甘草稍能緩莖中痛故用之

又方　補中益氣湯加南星蒼朮黃柏知母黃芩牛

滕燈草

防風羗活散 治下疳

防風　羗活　荊芥　獨活　黃芪

牛旁子　山梔　甘草　木通　蒼朮

車前子　天花粉

洗方　冬青葉四五十葉　甘草　黃柏

防風　煎湯洗之

下疳摻藥　輕者用輕粉末一味摻上

又方　孩兒茶　輕粉　黃柏　氷片

橄欖核〻煆錢一　爲末乾摻

蛀疳　輕粉　韶粉　各等分爲末摻之

外蛀捍內蛀捍

氷片二分　輕粉六分　射香五分　爲細末摻孔內

內外蛀疳瘡并小便一切疳疾

蒼术二錢　黃柏二錢　秦艽一錢　滑石二錢　水煎服

如小便澁滯疼痛加甘草節蒲黃

又方

黃芪　白蒺藜　羗活　白附子各二錢

末之用猪腰子一付竹刀切破入藥在內線扎定

白酒煑熟空心服之

內外蛀疳身熱小便澁滯宜服小柴胡湯加龍膽草

黃連車前子

下疳摻藥

青橄欖燒灰一錢　孩兒茶一錢　氷片三分　爲細末

先用杏仁四分去皮尖另研　又加輕粉四分　和研如泥先

敷患上一日米泔洗之後用前摻藥

又方　紅棗去核嵌明凡二分珍珠四粒煅過存性

末之乾摻

疼痛不可忍

黑羊角穿山甲煅過研末各二錢乳香沒各一錢

空心酒下

薰法　菉豆一升煮極爛茶葉五錢研末乘熱傾在多年馬桶內在無風處薰之待出一身汗妙甚男婦並用

小便瘡大爛者

面粉一兩　黃蠟八錢　白蠟一兩　冰片一錢

先用麻油三兩火上熬化二蠟隨下面粉次下冰片爲隔紙膏貼之五日后痛即止肉即生矣

陰戶瘡

婦人之性多偏而多鬱若有不遂則心肝胃三經

之火勃然而起遂致陰內生瘡其種不一或生陰
蝕瘡或生陰茄或生陰箄或生痔瘡或生翻花瘡
或生䘌瘡極痛極痒狀如蟲行淋瀝膿汁等症皆
由濕熱與心火相擊而生惟陰茄難治性氣和緩
之婦夠次坦夷服藥易愈若性急悍妬之婦習與
性成服藥百帖方愈必須忌口絕慾戒性爲要當
以補心養胃與茯苓補心湯內補托裏流氣飲間
服之其陰中腫塊如棗核者名陰茄扁如箄者名
陰箄陰中極痒者名蝕瘡名䘌瘡餘類倣此

茯苓補心湯

白茯　乾葛　前胡　桔梗　甘草
陳皮　白芍　紫蘇　人參　半夏
當歸　熟地　川芎　枳殼
姜三片棗肉二枚燈心廿根水二鍾煎服

補心養胃湯　陳皮　半夏　茯苓
甘草　台术　黄連　當歸　川芎
生地　青皮　白芍　檳榔　烏藥
遠志　滑石　山梔仁　車前子　玄胡索

內補托裏流氣飲　甘草節　茯苓　澤瀉
猪苓　紫蘇　山梔　黄連　台术

當歸　川芎　生地　白芍　人參

黃芪　木通　紫蘇　青皮　香附

苦參　澤瀉　白蒺藜

水黃膏　用黃連二兩水二碗文武火煎至一碗濾去査再重湯慢火煎至一酒杯加氷片三分射香二分輕粉五分硫黃末二錢俱研末調和用鵝毛潤陰內立効

一抹散

黃連末　鹿角灰各一錢　紅絨灰七分　雞內金灰一錢

孩兒茶七分　珍珠末五分　氷片五分　輕粉五分　射香三分

右爲細末乾摻患處

洗方　芭蕉根搗爛煎湯溫洗避風

又方　川椒五錢　蛇床子半升　礬三錢　桃柳枝各七枝　艾一兩

苦參一兩　水泔五六碗煎滚去查乘熱薰洗之

又方　治陰蝕瘡䘌瘙

雄黃一錢　硫黃五分　桃仁五粒　木鱉子一枚去殼剉片　艾

五錢入前藥在內作條放在爲桶薰之其蟲即死

麻黃湯　陰腫或瘡或爛

麻黃　黃連　蛇床子各五錢　艾三錢　烏梅三枚

大戟　防風　白芷　右剉煎湯薰洗再

孩兒茶一錢輕粉氷片杏仁灰各五分為末摻之

陰中極痒及蝕䘌瘡

用大蒜搗碎煎湯洗之後以杏仁不拘燒烟盡研

末絲綿包納陰戶

又方　取鷄肝或牛肝猪肝煮熟乘熱納入陰戶其

蟲入肝內

又方　水銀輕粉雄黃和棗肉研細無星納陰戶

又方　以鯽魚膽搽之

陰茄　用茄根燒灰末之香油調勻鵝毛潤內

陰中堅痛

白凡五錢　生大黃　生甘草各二錢五分　為末綿包如棗核大入陰中

陰中生瘡　黃芩湯　當歸　黃芩　川芎　大黃　白凡各二錢　黃連三錢　右剉水五碗煎薰洗洗付雄黃硫黃輕粉末

陰爛　孩兒茶　雞內金各一錢　輕粉五分　氷片三分　為細末乾摻

陰瘡　與男子妬精瘡畧同

黃丹　枯凡　扁蓄　藁本各一兩　硫黃五錢　蛇脫一條燒灰　為末搽之如不乾息再用芍藥末摻之

或隱處疼痛鹽三合炒熱青皮包熨之立止
陰冷母丁香十粒研末縫紗袋如指大入藥內納陰户
小便濕痛牛膝五兩酒二升煮半升去查作三服亦治
血結痛無故血尿龍骨一兩研末熱酒調下一匙

左右便毒

夫便毒者生于小腹兩腿合縫之間或行路遠涉辛苦或上或下低悶肭氣或房事所傷或男女大慾不得直遂其志故敗精滯血留聚中途或夢寐之間而不泄或妄想不能忘情息念故結成毒然腎者作強之官伎巧所出一有所感精血凝滯此

痃遂生初起之時寒熱交作兩腿牽絆腫起不能屈伸乃痃之漸也急服龍膽湯

龍膽草一錢 木鱉三枚 大黃三錢 瓜蔞一枚 桃仁

紅花 歸須各等分 水酒各一碗煎八分去查

夜露一宿早空心溫服行利十餘次

荊防敗毒散

穿山甲 甘草 紅花 羌活

當歸 川芎 赤芍 生地

金銀花 防風 木通 枳殼

烏藥 天花粉各一錢 槐花末二錢 牛膠五錢

小腸流注

此症受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣

飲再服淸心流氣飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇　桔梗　枳殼

甘草　香附　防風　川芎　羗活

獨活　白芷　白芍　檳榔　茴香

澤瀉　玄胡索　姜三棗一煎空心服

淸心流氣飲

澤瀉　麥冬　青皮　防風　柴胡

羗活　赤芍　香附　生地　川芎

紫蘇　甘草　姜三棗一煎服

小便不利加車前子滑石木通　時服蠟凡龙

穿襠發一名瘨癨一名橫痃

此毒因辛苦得之生于窮骨穴上若不速治毒潰

傷于谷道內爛臟腑即死急服盪毒散

盪毒飲　甘草　貝母　赤芍　當歸

白芷　金銀花　青皮　木通　連翹

桃仁　龍膽草　天花粉各一錢　穿山甲炮

如元氣欲泄加酒蒸大黃三四錢煎服飲酒隨量

以助藥力行廁十餘次其毒無膿血從大便中出

又方　欲作未作之時服之立消

皂角七片灰火煨黃色去皮陰地上去火毒爲末

酒下

代刀散　穿山甲　殭蠶　枳殼　姜黃

牽牛　赤石脂　大黃　白芷　貝母各等分

為細末每服五錢早辰空心用酒調下行利十餘次用薄粥補之其膿血從大便中出

灸初起便毒臟毒法

用濕蚯蚓糞捻成餅如銅錢厚放患處以艾火在餅上灸之覺熱一二十壯為度或痛或痒即可後服蠲毒散

外科圖說卷二終

